

Verslag Inventarisatie kansen roofvogels Zuidas- Zuidasdok Maart 2016



Inhoud

1. Aanleiding.....	3
2. Inleiding en werkwijze	3
3. Resultaten onderzoek	5
4. Nader onderzoek.....	7
Bijlage I. Kaart geïnventariseerde deelgebieden.....	9
Bijlage II. Kaart geïnventariseerde deelgebieden.....	10
Bijlage III Kansenskaart boomvalk	11
Bijlage IV Kansenskaart sperwer	12
Bijlage V Kansenskaart boomvalk-west	13
Bijlage VI Kansenskaart boomvalk-midden.....	14
Bijlage VI Kansenskaart boomvalk-oost	15
Bijlage VII Kansenskaart sperwer-west.....	16
Bijlage VIII Kansenskaart sperwer-midden	17
Bijlage IX Kansenskaart sperwer-oost	18

1. Aanleiding

Soorten van de lijst met jaarrond beschermde soorten (Min. LNV; 2009) verdienen speciale aandacht bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ontheffingsaanvragen voor deze soorten dienen goed gemotiveerd te worden. Hiervoor kan inzicht in de geschiedenis van nestplaatsen

2. Inleiding en werkwijze

Allereerst is er een indeling gemaakt in overzichtelijke min of meer homogene deelgebieden: rijen straatbomen, stukjes bosplantsoen, delen van een park, etc. Zodat de ze deelgebieden afzonderlijk beoordeeld kunnen worden (Zie bijlage I voor de onderverdeling in gebieden).

In de Nationale Databank Flora en fauna (NDFF) is er gekeken naar waarnemingen van broedende eksters, kraaien, houtduiven en roofvogels buizerd, boomvalk, sperwer, bosuil en ransuil.

Bij de veldverkenning zijn de deelgebieden beoordeeld op een aantal kenmerken.

Voor de kans rijkheid van een sperwer was dit:

- Rustig stukje bosplantsoen;
- Dichte ondergroei;
- Bomen geschikt voor nesten;
- Aanwezigheid geschikte nesten.

Voor de kans op een boomvalk:

- Hoge bomen;
- Geschiktheid voor kraaiennesten;
- Aanwezigheid van kraaiennesten.

van dit type vogels nuttig zijn. Voor het plangebied Zuidas en Zuidasdok zijn de sperwer, de boomvalk en de buizerd de soorten die verwacht kunnen worden. Van deze soorten is ook al aangetoond dat ze in het plangebied kunnen broeden.

De kans op een buizerd is verder niet beoordeeld. Een buizerd heeft met de boomvalk te vergelijken eisen aan een broedlocatie; maar zal voor nog rustigere plekken kiezen. Een deel van de locaties, die geschikt zijn voor zowel sperwer als boomvalk zijn ook geschikt als broedplaats voor een buizerd.

Ransuilen kunnen in volkstuinparken verwacht worden. Ze nestelen in dichte begroeiing, bijvoorbeeld in conifeerhagen.

De classificatie van de deelgebieden is gebaseerd op expert judgement. Voor de geschatte kans is er een onderverdeling in vier klassen gemaakt.

- Nihil: de locatie is totaal ongeschikt als broedplaats voor de betreffende vogel;
- Klein: de locatie lijkt niet geschikt, maar het is toch niet uit te sluiten dat de betreffende vogel daar gaat broeden;
- Middel; de locatie is matig geschikt;
- Hoog: de locatie is als geschikt beoordeeld voor de betreffende soort.

Waargenomen nesten zijn genoteerd en op kaart gezet. Indien er van een nest voldoende kenmerken te zien zijn, dan is de naam van de vogel die het waarschijnlijk gebruikt erbij gezet. Soms was de vogel in de buurt en was de vermoedelijke soort eenvoudiger te bepalen.

Niet alle nesten waren op uiterlijke kenmerken in te delen (Zie bijlage II voor de waargenomen nesten).

Een paar deelgebiedjes waren onbereikbaar. Door de ligging tussen afslag en A10 waren ze niet toegankelijk of niet betreedbaar zonder toestemming van Rijkswaterstaat.


3. Resultaten onderzoek

Opmerkelijke waarnemingen

Vlakbij het Duivendrecht kanaal vloog een buizerd op uit een oude met klimop begroeide wilg, en keerde even later terug. Een nest was zichtbaar. Volgens een bewoner zat er al jaren een buizerd. Er is overigens maar één exemplaar gezien. Verder is er drie keer een opvliegende buizerd gezien: bij volkstuinenpark Ons Buiten, bij de noordelijke afslag van de A10 bij de VU en in het Beatrixpark (Remco Bakker). Op twee plaatsen is er een nestkast van een bosuil waargenomen; bij de Riekerpolder en in het Beatrixpark. De aanwezigheid van een bosuil in het Beatrixpark was bekend, niet duidelijk is of de opgehangen nestkast gebruikt wordt. Het is ook niet bekend of de kast in de Riekerpolder gebuikt wordt. Tussen de Joan Muyskenweg en het Duivendrechtse kanaal zitten twee nesten dicht bij elkaar in een conifeer. Deze nesten zouden heel goed van een sperwer kunnen zijn. Minder opmerkelijk is de waarneming van een sperwer bij een bosje naast de RAI. Hier wordt al jaren door sperwers gebroed.

Overige informatie

In het Amstelpark is het Amstelpark door de heer P.Y. Bergkamp geïnventariseerd. Roofvogels zijn bij deze inventarisatie niet aangetroffen.



Boom met buizerdnest

NDFF

Raadpleging van de Nationale databank Flora en fauna (NDFF) leverde geen aanvullende informatie op. De aangegeven nestplaatsen van boomvalk en sperwer waren al bekend. In het talud ten zuiden van de A10, vlakbij de Amstel staat een waarneming van

Resultaten

De veldverkenning heeft een aantal bomenrijen en stukjes bosplantsoen opgeleverd, waarvan de kans dat een roofvogel daar

een nest van een boomvalk. Navraag leverde echter op dat dit nest niet op de juiste plaats was ingetekend. De juiste plaats was net ten zuiden van de oostelijke aanlanding van de Utrechtse brug in plaats van bij de Rozenoordbrug.

gaat broeden relevant is. De kansenkaarten zijn als bijlagen toegevoegd. Bijna nooit is de kans nul

4. Nader onderzoek

Soortenstandaards

Het ministerie heeft een aantal soortenstandaards opgesteld. Hierin staat hoe gemitigeerd kan worden en welke voorwaarden er aan onderzoek worden gesteld. Voor de buizerd is er een soortenstandaard; voor de sperwer en voor de boomvalk niet. In de soortenstandaard is beschreven hoe onderzoek moet zijn uitgevoerd om vast te stellen dat er zich geen broedende buizerd op een locatie bevindt. *“Aangenomen kan worden dat er geen broedende buizerds aanwezig zijn als er tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode maart tot half mei geen aanwezigheid kan worden aangetoond. De inventarisatie moet tijdens goede omstandigheden (zoals weersomstandigheden, moment op de dag) plaats hebben gevonden en met een tussenperiode van minimaal 10 dagen. Tevens moet er in de periode dat er nog geen blad aan de boom zit minimaal één maal gericht naar nestlocaties zijn gezocht. Overigens kan het daadwerkelijke broeden van de buizerd plaatsvinden van half maart tot en met augustus, maar het exacte moment is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden en kan per broedpaar verschillen.”*


Richtlijnen nader onderzoek

De SOVON heeft een document opgesteld met richtlijnen voor de inventarisatie van broedvogels. Hierin staat aan welke eisen een waarneming moet voldoen om als broedgeval erkend te worden. Voor de **sperwer**: Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel naar nest, alarm, afvliegende ouder, jongen op nest) telt altijd. In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts: moeten er 2 waarnemingen zijn in **de periode 1 maart t/m 15 juli** en in totaal 3 waarnemingen in gehele periode. In overige gevallen (adult in broedbiotoop): moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 10 april t/m 15 juli en in totaal 3 waarnemingen in gehele periode. Voor de **boomvalk**: Nestindicatieve waarneming (bezet nest, fel alarm, voedseltransport naar nest) telt altijd. In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts: moeten er 2 waarnemingen zijn in **de periode 1 mei t/m 31 augustus** en in totaal 3 waarnemingen in gehele periode. Een uitgebreide beschrijving van de broedbiotoop van sperwer en boomvalk is te lezen in de bijlage van het onderzoek van Waardenburg naar de sperwer en de boomvalk voor het Kenniskwartier in 2013.


5. Conclusies en aanbevelingen

Uit de inventarisatie blijkt dat er in het onderzoeksgebied een flink aantal gebieden liggen, die geschikt zijn als broedplaats voor een roofvogel als sperwer, boomvalk of buizerd. Een sperwer lijkt in de stad niet erg kritisch te zijn en is ook te vinden in op het eerste gezicht minder geschikte locaties. Om bij planontwikkeling niet verrast te worden door de aanwezigheid van een broedende vogel, waarvan het nest jaarrond beschermd is, wordt aanbevolen om twee jaar voor de beoogde planontwikkeling volgens de soortenstandaard of de SOVON-richtlijnen onderzoek te doen naar roofvogels en ook bij de zichtbare nesten de bijbehorende vogel te registreren.


Bijlage I. Kaart geïnventariseerde deelgebieden




Bijlage II. Kaart geïnventariseerde deelgebieden




Bijlage III Kansenskaart boomvalk




Bijlage IV Kansenkaart sperwer




Bijlage V Kansenskaart boomvalk-west




Bijlage VI Kansenskaart boomvalk-midden




Bijlage VI Kansenkaart boomvalk-oost



Bijlage VII Kansenkaart sperwer-west



Bijlage VIII Kansenskaart sperwer-midden



Bijlage IX Kansenkaart sperwer-oost

